

PRODUKSIETOESTANDE VERSLAG

03 Julie 2026

Hierdie verslag word elke 2 weke
opgedateer



Gewas toestand
Crop Condition



Klimaat
Climate



Vergelyk
Compare



Opbrengs potensiaal
Production potential



Gewas opkoms
Greenup



Kaarte
Maps



Verslae
Report

Indeks

1. 2025 FINALE OPPERVLAKTE AANGEPLANT EN PRODUKSIE-SYFERS
2. 2026 VOORNEME OM TE PLANT
3. 2026 KORING VOORNEME OM TE PLANT PER PROVINSIE
4. DEFINISIES
5. OPSOMMING
6. REËNVAL
7. GEWASOPKOMS
8. GRONDVOG INDEKS
9. GEWAS TOESTAND

FINALE OPPERVLAKE AANGEPLANT EN PRODUKSIE VAN WINTERGRAAN VIR DIE 2025-PRODUKSIESEISOEN



GEWAS	FINALE OPPERVLAKTE HA (A)	FINALE PRODUKSIE AANGEPAS TON (B)	NOK OPPERVLAKTE AANGEPLANT HA (C)	NOK LAASTE SKATTING TON (D)	FINALE OES vs FINALE SKATTING % (B) ÷ (D)
Koring	517 300	1 905 500	517 300	1 897 220	0,44%
Gars	96 950	345 000	96 950	346 430	-0,41%
Kanola	174 515	306 000	174 515	309 035	-0,98%
Hawer	35 520	43 500	35 520	45 143	-3,64%

Op 28 Julie sal die voorlopige oppervlakte vir wintergraan wat aangeplant is, deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel word.

2026 VOORNEME OM TE PLANT

Vrygestel 23 April 2026



GEWAS	Voorname* 2026	Opp aangeplant 2025	Finale produksie skatting 2025	Verandering
Ha	Ha		Tons	%
soos op 23 April 2026				
	(A)	(B)	(C)	(A) ÷ (B)
Koring	486 400	517 300	1 897 220	-5,97%
Gars	101 900	96 950	346 430	5,11%
Kanola	189 175	174 515	309 035	8,40%
Hawermout	39 000	35 520	45 143	9,80%
Soetlupine	21 000	21 000	17 850	0,00%
Totaal wintergraan	837 475	845 285	2 615 678	-0,92%

*Bron: Oesskatting Komitee

2026 KORING VOORNEME OM TE PLANT

per provinsie

Provinsie/ Province	Voorname/ Intentions Ha 2026	Opp beplant/ Area planted Ha 2025	Finale skatting/ Final estimate Tons 2025
Wes-Kaap/Western Cape	335 000	363 000	980 100
Noord-Kaap/Northern Cape	41 000	40 000	300 000
Vrystaat/Free State	55 000	57 000	265 050
Oos-Kaap/Eastern Cape	5 500	5 500	37 400
KwaZulu-Natal	8 000	8 500	51 000
Mpumalanga	3 000	3 500	22 400
Limpopo	28 000	28 000	165 200
Gauteng	900	800	5 120
Noordwes/North West	10 000	11 000	70 950
Totaal/Total	486 400	517 300	1 897 220

Op 28 Julie sal die voorlopige oppervlakte vir wintergraan wat aangeplant is, deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel word.

Definisies

Grondwaterindeks (GWI):

Die GWI is 'n indikasie van die grondwaterpersentasie regdeur die groeiseisoen. Dit vergelyk drie periodes: die huidige seisoen, die vorige seisoen en die 5-jaar gemiddeld. Die 5-jaar gemiddeld dien as 'n basislyn wat tipiese grondwatertoestande aandui.

Groenblaarindeks (GLI)

Die GLI is 'n indikasie van gewasgroei en -ontwikkeling deur die seisoen, met toestande oor die meeste winterreënvalstreke bo die 5 jaar gemiddelde.

Gewastoestande

Gewastoestande beskryf die algehele gesondheid en opbrengspotensiaal van gewasse, gebaseer op reënval, grondvog en omgewingsstresfaktore.

Al die 2026/27 seisoen data is van 20 Maart tot 02 Julie 2026.

Opsomming

Reënvalpatrone en -tendense

Reënvaltoestande in die Wes-Kaapse wintergraangebiede was die afgelope tyd oor die algemeen gunstig, met gereelde en konstante neerslae wat oor groot dele van die Overberg en Swartland ontvang is. Sommige gebiede het tussen 2 mm en 32 mm reën aangeteken, wat grondvogtoestande verbeter en goeie gewasontwikkeling ondersteun het. Die Noord-Swartland het onlangs welkome reën ontvang ná vroeër droër toestande, terwyl dele van die Suid-Kaap, veral rondom Mosselbaai en George, steeds baie nat bly met plaaslike versuiptoestande. Ondanks wisselende toestande tussen gebiede ondersteun die koel temperature en opvolgreën oor die algemeen gunstige groeitoestande vir wintergewasse.


Grondvogdinamika

Grondvogtoestande in die Wes-Kaapse wintergraangebiede wissel tans tussen streke en selfs plaaslik binne gebiede. Gereelde reënval oor groot dele van die Overberg en Swartland het grondvog oor die algemeen goed ondersteun, met verbeterde toestande veral in die Noord-Swartland ná onlangse reën. In die oostelike dele van die Suid-Kaap, veral rondom Mosselbaai en George, bly toestande egter baie nat met plaaslike versuiptoestande wat aangemeld word. Ander gebiede benodig steeds opvolgreën om optimale vogvlakke deur die res van die seisoen te handhaaf.

Gewasopkoms en -toestand

Gewasopkoms en gewas-toestande in die Wes-Kaapse wintergraangebiede bly oor die algemeen gunstig, met die meeste gewasse wat goed ontwikkel en sterk groei toon. Gereelde reënval en koel temperature het goeie groeitoestande ondersteun, terwyl kanola in verskeie gebiede reeds begin blom het. Gewasse wissel egter tussen gebiede as gevolg van oorplantings wat vroeër in die seisoen plaasgevind het, veral in dele van die Swartland en die oostelike Suid-Kaap. In sekere nat gebiede rondom Mosselbaai en George beïnvloed oormatige vog en plaaslike versuiptoestande steeds vestiging en bestuur, hoewel die algemene toestand van gewasse positief bly.

Totale Reënval/Total Rainfall



Suid-Kaap

Geen noemenswaardige reënval is hierdie week aangeteken nie maar in die oostelike gedeeltes van die streek bly grondvog steeds hoog. Reënval het plek-plek geval.


Swartland

Reënval in die Swartland het die afgelope tyd verbeter, met baie gebiede wat welkome neerslae ontvang het. In die Malmesbury-omgewing het reënval tussen gebiede gewissel, met sommige dele wat tot 32 mm ontvang het. Die Noord-Swartland, wat vroeër baie droog was, het onlangs ook reën ontvang wat grondvogtoestande merkbaar verbeter het. Hoewel grondvog tussen gebiede verskil, het die algemene reënval bygedra tot beter toestande vir gewasontwikkeling

Overberg

Wydverspreide reënval is oor groot dele van die Overberg ontvang, met ongeveer 10 mm wat gedurende die afgelope naweek geval het, terwyl verdere neerslae van tussen 2 mm en 10 mm ook gedurende die week aangeteken is. Die konstante en gereelde reënval oor die afgelope maand het gunstige grondvogtoestande in die streek ondersteun, hoewel grondvog steeds tussen gebiede wissel.

Reënval vir die afgelope 30 dae/Rainfall for the past 30 days




Seisoen reënval afwyking/Season rainfall deviation



0-10 mm	10-25 mm	25-50 mm	60-75 mm	75-125 mm	125-175 mm	175-250 mm	>250 mm	Bale Laag Very Low	Middelmatig laag Moderately Low	Effens Laag Slightly Below	Normaal Normal	Effens Hoog Slightly Above	Middelmatig Hoog Moderate Higher	Bale Hoog Well Above
---------	----------	----------	----------	-----------	------------	------------	---------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

**Al die data vir die 2026/27 seisoen is vanaf 20 Maart tot 02 Julie 2026*

Grondvog Indeks / Soil Water Index



Suid-Kaap

Grondvogtoestande in die Suid-Kaap wissel tans tussen gebiede. Rondom Swellendam bly toestande oor die algemeen gunstig, met voldoende vog wat goeie gewasontwikkeling ondersteun. Verder oos, veral in dele rondom Mosselbaai en George, bly toestande baie nat ná aanhoudende reënval, met sekere areas wat steeds versuip-toestande ervaar. In ander dele van die streek begin grondvogvlakke afneem en addisionele reën sal voordelig wees om optimale groeitoestande te handhaaf. Die ongelyke verspreiding van reënval veroorsaak dus uiteenlopende toestande tussen die westelike en oostelike gedeeltes van die Suid-Kaap.


Swartland

Grondvogtoestande in die Swartland wissel tans tussen gebiede, maar het oor die algemeen verbeter ná die onlangse reënval. In dele van die Malmesbury-omgewing het goeie neerslae bygedra tot voldoende vogvlakke, terwyl die Noord-Swartland, wat vroeër droog was, ook betekenisvolle verbetering in grondvog ervaar het ná die jongste reën. Rondom Moorreesburg bly grondvog oor die algemeen gunstig en ondersteun dit goeie gewasontwikkeling. Sekere gebiede benodig egter steeds verdere opvolgreën om optimale vogtoestande deur die res van die seisoen te handhaaf.

Overberg

Grondvogtoestande bly effens bo tot middelmatig hoog oor die langtermyn-gemiddeld regoor die streek. Huidige vogvlakke ondersteun sterk vegetatiewe ontwikkeling wat strek regoor tot die blomfase.

Gewasopkoms per Distrik / Crop Greenup per District



Suid-Kaap

Gewasopkoms in die Suid-Kaap is oor die algemeen goed, met die meeste aanplantings wat sterk ontwikkeling toon danksy gunstige vogtoestande oor groot dele van die streek. Kanola het in verskeie areas reeds die blomstadium bereik en vertoon goed. In die natter oostelike gedeeltes van die streek, veral rondom Mosselbaai en George het oormatige reënval en versuip-toestande egter op sekere plekke tot ongelyke opkoms en uitdagings met vestiging gelei. Sommige produsente in die ooste is steeds besig met oorplantings van koring waar toestande dit vereis.

Swartland

Gewasopkoms in die Swartland is oor die algemeen goed, ondanks uitdagende toestande vroeër in die seisoen. Die onlangse reënval het opkoms en verdere ontwikkeling ondersteun, veral in gebiede wat voorheen onder droër toestande gebuk gegaan het. Plantestand word as gemiddeld tot goed beskryf, hoewel gewasse tussen gebiede wissel aangesien baie produsente vroeër in die seisoen moes oorplant. Kanola begin reeds blom in sekere dele van die streek, terwyl later aangeplante kanola na verwagting binnekort ook die blomstadium sal bereik.

Overberg

Gewasgroei en vergroening bly matig bo die langtermyn-gemiddeld regoor die streek. Kanolalande is besonder goed ontwikkel en begin blom in sekere gebiede, terwyl koring en gars gesonde vegetatiewe groei toon. Algehele gewasontwikkeling word beskou as ideaal vir hierdie stadium van die seisoen en kouer temperature is die afgelope week ontvang.

Gewas Toestand / Crop Condition



**Al die data vir die 2026/27 seisoen
is vanaf 20 Maart tot 02 Julie 2026*



Gewastoestande

Suid-Kaap

Gewastoestande in die Suid-Kaap bly oor die algemeen gunstig, met die meeste gewasse wat goed ontwikkel en sterk groei toon. Rondom Swellendam vertoon gewasse baie goed, terwyl kanola reeds in die blomstadium beweeg en goeie potensiaal toon. Topbemesting op kanola is reeds grotendeels afgehandel. In die oostelike dele van die streek, veral rondom Mosselbaai en George, beïnvloed oormatige grondvog en versuiptoestande sekere gebiede. Alhoewel gewasse oor die algemeen goed lyk, skep die nat toestande plaaslik uitdagings vir vestiging en bestuur.

Swartland

Gewastoestande in die Swartland bly oor die algemeen gunstig, met die meeste gewasse wat goed ontwikkel en sterk groei toon. Die onlangse reënval het grootliks bygedra tot verbeterde toestande, veral in gebiede wat vroeër droog was. Koue temperature wat gedurende die week ervaar is, ondersteun ook die ontwikkeling van wintergewasse. Gewasse wissel egter tussen gebiede as gevolg van oorplantings wat vroeër in die seisoen plaasgevind het. Rondom Moorreesburg lyk gewasse goed, terwyl topbemesting reeds gestrooi is en laaste bespuitings tans plaasvind. Kanola begin in verskeie gebiede blom, met laat aangeplante kanola wat na verwagting binnekort ook die blomstadium sal bereik.

Overberg

Gewastoestande in die Overberg bly oor die algemeen baie gunstig, met die meeste gewasse wat sterk groei en goeie ontwikkeling toon. Die gereelde en konstante reënval wat oor die afgelope maand ontvang is, het bygedra tot voldoende grondvogvlakke in groot dele van die streek, hoewel toestande steeds tussen sekere gebiede wissel. Die koel temperature wat gedurende die week voorgekom het, het ideale toestande vir wintergewasse geskep en goeie groeistadiums ondersteun. Topbemesting is grotendeels afgehandel en produsente fokus tans op swambeheerprogramme om opbrengspotensiaal te beskerm. Kanola-aanplantings begin reeds blom, terwyl ander gewasse ook baie belowend vertoon.

SLAKKE OF NAAKSLAKKE IN U LANDE?

Dr Vicki Tolmay monitor hierdie seisoen slak- en naakslakpopulasies.

Indien u enige aktiwiteit in u lande opmerk, kontak asseblief:

DR VICKI TOLMAY



0734690000



DANKIE!

Vir enige navrae:

Grain SA

Heleen@grainsa.co.za/Cathrine@grainsa.co.za/Gerrit@grainsa.co.za

Vrywaring: Die inligting hierin is verkry uit verskeie bronne, waarvan Graan SA nie die akkuraatheid en/of volledigheid waarborg nie en waarvoor Graan SA geen aanspreeklikheid aanvaar nie. Enige pryse of vlakke hierin vervat is voorlopig en slegs aanduidend en verteenwoordig nie biedings of aanbiedinge nie. Hierdie aanduidings word slegs vir u inligting en oorweging verskaf.

GRAIN | GRAAN