

PRODUKSIETOESTANDE VERSLAG

20 Julie 2026

Hierdie verslag word elke 2 weke
opgedateer



Gewas toestand
Crop Condition



Klimaat
Climate



Vergelyk
Compare



Opbrengs potensiaal
Production potential



Gewas opkoms
Greenup



Kaarte
Maps



Verslae
Report

Indeks

1. 2025 FINALE OPPERVLAKTE AANGEPLANT EN PRODUKSIE-SYFERS
2. 2026 VOORNEME OM TE PLANT
3. 2026 KORING VOORNEME OM TE PLANT PER PROVINSIE
4. DEFINISIES
5. OPSOMMING
6. REËNVAL
7. GEWASOPKOMS
8. GRONDVOG INDEKS
9. GEWAS TOESTAND

FINALE OPPERVLAKE AANGEPLANT EN PRODUKSIE VAN WINTERGRAAN VIR DIE 2025-PRODUKSIESEISOEN



GEWAS	FINALE OPPERVLAKTE HA (A)	FINALE PRODUKSIE AANGEPAS TON (B)	NOK OPPERVLAKTE AANGEPLANT HA (C)	NOK LAASTE SKATTING TON (D)	FINALE OES vs FINALE SKATTING % (B) ÷ (D)
Koring	517 300	1 905 500	517 300	1 897 220	0,44%
Gars	96 950	345 000	96 950	346 430	-0,41%
Kanola	174 515	306 000	174 515	309 035	-0,98%
Hawer	35 520	43 500	35 520	45 143	-3,64%

Op 28 Julie sal die voorlopige oppervlakte vir wintergraan wat aangeplant is, deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel word.

2026 VOORNEME OM TE PLANT

Vrygestel 23 April 2026



GEWAS	Voorname* 2026	Opp aangeplant 2025	Finale produksie skatting 2025	Verandering
Ha	Ha		Tons	%
soos op 23 April 2026				
	(A)	(B)	(C)	(A) ÷ (B)
Koring	486 400	517 300	1 897 220	-5,97%
Gars	101 900	96 950	346 430	5,11%
Kanola	189 175	174 515	309 035	8,40%
Hawermout	39 000	35 520	45 143	9,80%
Soetlupine	21 000	21 000	17 850	0,00%
Totaal wintergraan	837 475	845 285	2 615 678	-0,92%

*Bron: Oesskatting Komitee

2026 KORING VOORNEME OM TE PLANT

per provinsie

Provinsie/ Province	Voorname/ Intentions Ha 2026	Opp beplant/ Area planted Ha 2025	Finale skatting/ Final estimate Tons 2025
Wes-Kaap/Western Cape	335 000	363 000	980 100
Noord-Kaap/Northern Cape	41 000	40 000	300 000
Vrystaat/Free State	55 000	57 000	265 050
Oos-Kaap/Eastern Cape	5 500	5 500	37 400
KwaZulu-Natal	8 000	8 500	51 000
Mpumalanga	3 000	3 500	22 400
Limpopo	28 000	28 000	165 200
Gauteng	900	800	5 120
Noordwes/North West	10 000	11 000	70 950
Totaal/Total	486 400	517 300	1 897 220

Op 28 Julie sal die voorlopige oppervlakte vir wintergraan wat aangeplant is, deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel word.

Definisies

Grondwaterindeks (GWI):

Die GWI is 'n indikasie van die grondwaterpersentasie regdeur die groeiseisoen. Dit vergelyk drie periodes: die huidige seisoen, die vorige seisoen en die 5-jaar gemiddeld. Die 5-jaar gemiddeld dien as 'n basislyn wat tipiese grondwatertoestande aandui.

Groenblaarindeks (GLI)

Die GLI is 'n indikasie van gewasgroei en -ontwikkeling deur die seisoen, met toestande oor die meeste winterreënvalstreke bo die 5 jaar gemiddelde.

Gewastoestande

Gewastoestande beskryf die algehele gesondheid en opbrengspotensiaal van gewasse, gebaseer op reënval, grondvog en omgewingsstresfaktore.

Al die 2026/27 seisoen data is van 20 Maart tot 14 Julie 2026.

Opsomming

Reënvalpatrone en -tendense

Reënval oor die wintergraanstreke was die afgelope tyd beperk, met die meeste gebiede wat geen noemenswaardige opvolg reën sedert die einde van Junie ontvang het nie. Gevolglik raak toestande toenemend droog en neem grondvogvlakke af, veral in die Overberg en Swartland. Die Swartland het gedurende Junie slegs 34 mm reën ontvang – die droogste Junie in 23 jaar – terwyl die Bredasdorp-gebied in die Overberg sedert einde Junie geen betekenisvolle reën ontvang het nie.

In die Suid-Kaap verskil toestande tussen gebiede, met die Swellendam-omgewing wat droër raak, terwyl die Mosselbaai-gebied steeds oor beter grondvog beskik. **Goeie opvolgreën word oor al drie streke benodig om grondvog aan te vul en die gunstige ontwikkeling van die wintergewasse te ondersteun.**


Grondvogdinamika

Grondvogtoestande het oor die meeste wintergraanstreke verswak as gevolg van die beperkte opvolgreën. Die grootste vogtekorte word in die Swartland aangeteken, waar grondvogvlakke kritiek laag is, terwyl toestande in die Overberg ook geleidelik verswak. In die Suid-Kaap wissel grondvog tussen gebiede, met afnemende grondvog in die Swellendam-omgewing en gunstiger vogtoestande in die Mosselbaai-gebied. Verdere opvolgreën word oor al drie streke benodig om grondvogvlakke aan te vul en die voortgesette ontwikkeling van die wintergewasse te ondersteun.

Gewasopkoms en -toestand

Gewasse in die wintergraanstreke vertoon oor die algemeen goed, ondanks die toenemende vogtekorte in verskeie gebiede. Kanola is hoofsaaklik in die blomstadium, terwyl koring oor die algemeen goed ontwikkel en in sommige gebiede reeds begin skiet. Die koue wintertoestande het die ontwikkeling en vestigingsproses van die gewasse ondersteun, en die algemene gewas toestande bly gunstig. Voortgesette droë toestande en afnemende grondvog kan egter die gewasontwikkeling en opbrengspotensiaal nadelig beïnvloed indien betekenisvolle opvolgreën nie binnekort voorkom nie.

Totale Reënval/Total Rainfall



Suid-Kaap

Geen noemenswaardige opvolgreën is onlangs oor groot dele van die Suid-Kaap ontvang nie, wat daartoe gelei het dat grondvogvlakke geleidelik afneem. Die gebied raak toenemend droog, met grondvog wat veral in die Swellendam-omgewing begin afneem, terwyl die Mosselbaai-gebied steeds oor beter grondvogtoestande beskik. Verdere reën word benodig om voldoende grondvog te handhaaf en die gewasontwikkeling te ondersteun.


Swartland

Junie was buitengewoon droog in die Swartland, met slegs 34 mm reën wat vir die maand aangeteken is – die laagste Junie-reënval in 23 jaar. Geen noemenswaardige opvolgreën is sedertdien ontvang nie, wat daartoe gelei het dat grondvogvlakke kritiek laag is. Die streek benodig dringend goeie opvolgreën om die vogtekort aan te vul en die huidige gewasontwikkeling te ondersteun.

Overberg

Geen noemenswaardige reënval is sedert die einde van Junie oor die Overberg ontvang nie, met die laaste betekenisvolle reën wat aan die einde van Junie voorgekom het. Gevolglik raak toestande in die streek toenemend droog en grondvogvlakke neem af. Die streek benodig dringend opvolgreën om voldoende grondvog te herstel en die huidige gewasontwikkeling te ondersteun.


Reënval vir die afgelope 30 dae/Rainfall for the past 30 days



Seisoen reënval afwyking/Season rainfall deviation



Grondvog Indeks / Soil Water Index



**Al die data vir die 2026/27 seisoen
is vanaf 20 Maart tot 14 Julie 2026*

Leaflet | Icon Map | Tiles © Mapbox © OpenStreetMap

Suid-Kaap

Grondvogtoestande in die Suid-Kaap verswak geleidelik namate die gebied droër raak. Grondvogvlakke neem veral in die Swellendam-omgewing af, terwyl die Mosselbaai-gebied steeds oor beter grondvog beskik. Verdere reën sal noodsaaklik wees om voldoende grondvog vir die voortgesette ontwikkeling van die gewasse te handhaaf. Die gewasse in die streek benodig voldoende grondvog om die blomstadium van kanola optimaal te ondersteun en gunstige toestande vir verdere groei en opbrengsontwikkeling te verseker.


Swartland

Grondvogtoestande in die Swartland is kritiek laag ná die buitengewone droë Junie-maand. Die vogtekort begin al hoe duideliker sigbaar raak, met tekens van vogstremming wat in sommige lande voorkom. Hoewel die gewasse oor die algemeen steeds goed vertoon, word dringende opvolgreën benodig om grondvog aan te vul en die huidige gewasontwikkeling te ondersteun.

Overberg

Grondvogtoestande in die Overberg neem geleidelik af, veral in die Bredasdorp-gebied waar geen noemenswaardige reën sedert die einde van Junie ontvang is nie. Die streek raak toenemend droog, en hoewel die gewasse steeds goed vertoon, word dringende opvolgreën benodig om grondvog aan te vul en die huidige gewasontwikkeling te ondersteun. Voldoende grondvog word benodig om die blomstadium van kanola te ondersteun en die gewasse se opbrengspotensiaal te handhaaf.

Gewasopkoms per Distrik / Crop Greenup per District



Suid-Kaap

Gewasse in die Suid-Kaap ontwikkel oor die algemeen goed. Kanola is in die blomstadium en vertoon goed, terwyl laat aangeplante koring, waar lande vroeër in die seisoen oorgeplant moes word, goed gevestig is en bevredigend ontwikkel. Ten spyte van die droër toestande handhaaf die gewasse steeds 'n goeie voorkoms.

Swartland

Gewasse in die Swartland ontwikkel oor die algemeen goed ten spyte van die aanhoudende droë toestande. Kanola vorder goed en is in sommige gebiede in die blomstadium, terwyl koring goed vertoon en in sekere areas reeds begin aar skiet. Die koue weer bevorder die vestigingsproses van die koring, maar dringende opvolgreën word benodig om verdere ontwikkeling en opbrengspotensiaal te ondersteun.

Overberg

Gewasse in die Overberg ontwikkel oor die algemeen goed, met kanola wat tans in die blomstadium is en koring wat begin aar skiet. Ten spyte van die toenemende droë toestande vertoon die gewasse steeds goed, maar tydige opvolgreën sal noodsaaklik wees om optimale groei en opbrengspotensiaal te ondersteun.

Gewas Toestand / Crop Condition



*Al die data vir die 2026/27 seisoen
is vanaf 20 Maart tot 14 Julie 2026

SLAKKE OF NAAKSLAKKE IN U LANDE?

Dr Vicki Tolmay monitor hierdie seisoen slak- en naakslakpopulasies.

Indien u enige aktiwiteit in u lande opmerk, kontak asseblief:

DR VICKI TOLMAY



0734690000



DANKIE!

Vir enige navrae:

Grain SA

Cathrine@grainsa.co.za/Gerrit@grainsa.co.za

Vrywaring: Die inligting hierin is verkry uit verskeie bronne, waarvan Graan SA nie die akkuraatheid en/of volledigheid waarborg nie en waarvoor Graan SA geen aanspreeklikheid aanvaar nie. Enige pryse of vlakke hierin vervat is voorlopig en slegs aanduidend en verteenwoordig nie biedings of aanbiedinge nie. Hierdie aanduidings word slegs vir u inligting en oorweging verskaf.

GRAIN | GRAAN