

PRODUKSIETOESTANDE VERSLAG

18 Maart 2026



Gewas toestand
Crop Condition



Klimaat
Climate



Vergelyk
Compare



Opbrengs potensiaal
Production potential



Gewas opkoms
Greenup



Kaarte
Maps



Verslae
Report

Indeks

1. DEFINISIES
2. FINALE OPPERVLAKTE
3. OPSOMMING
4. REËNVAL
5. GRONDVOG INDEKS
6. GEWASOPKOMS
7. GROENBLAAR INDEKS

Definisies

- **Grondvog Indeks:**

Gee 'n oorsig van die grondwaterpersentasie gedurende die groeiseisoen. Dit vergelyk drie periodes: die huidige seisoen, die vorige seisoen en die 5-jaar gemiddelde. Hierdie gemiddelde dien as 'n basislyn wat tipiese grondwatertoestande aandui.

- **Groenblaar Indeks (GLI):**

Die GLI is die waardes oor die groeiseisoen, wat die patrone van gewasgroei gedurende die seisoene illustreer.

- **Gewasopkoms:**

Toon die huidige gewasopkoms-vordering in vergelyking met die 5-jaar gemiddeld.

- **Gewastoestande**

Gewastoestande beskryf die algehele gesondheid en opbrengspotensiaal van gewasse, gebaseer op reënval, grondvog en omgewingsstresfaktore.

Al die 2025/26 seisoen data is vanaf 1 Julie 2025 tot 18 Maart 2026.

FINALE OPPERVLAKTE

SUMMARY: FINAL AREA PLANTED AND CROP PRODUCTION FIGURES OF COMMERCIAL SUMMER CROPS FOR 2025:

CROP	FINAL AREA PLANTED 2025 HA (A)	FINAL CROP ¹⁾ 2025 TONS (B)	CEC AREA PLANTED NOV 2025 HA (C)	CEC FINAL ESTIMATE ²⁾ NOV 2025 TONS (D)	FINAL CROP vs FINAL ESTIMATE % (B) ÷ (D)
White Maize	1 599 700	8 450 000	1 599 700	8 378 250	+0,86
Yellow Maize	997 000	8 200 000	997 000	8 057 400	+1,77
Total Maize	2 596 700	16 650 000	2 596 700	16 435 650	+1,30
Sunflower seed	555 700	700 000	555 700	708 300	-1,17
Soybeans	1 151 000	2 800 000	1 151 000	2 771 225	+1,04
Groundnuts	48 125	63 350	48 125	62 474	+1,40
Sorghum	41 150	150 000	41 150	146 605	+2,32

1) For ease of reference, projected figures have been rounded to the nearest 1 000 tons.

2) As estimated by the CEC on 27 November 2025

Bron: **NOK**

Opsomming

Gewastoestande


Gewastoestande oor die somergraan streke is oor die algemeen gunstig, hoewel variasie steeds voorkom weens vroeëre droogte en ongelyke verspreiding van reënval. Die grootste gedeelte van die Vrystaat lyk goed, ondersteun deur konstante reënval en goeie grondvog, met algemene positiewe opbrengsvooruitsigte ondanks sommige vroeë mielies wat deur die Januarie-droogteperiode geraak is. Die Oostelike-Hoëveld lyk ook gemiddeld tot bo gemiddeld, met gewasse in gemengde groeistadiums en later aanplantings wat goeie potensiaal toon ná onlangse reën. In Limpopo is toestande meer gemeng, aangesien ondergemiddelde en ongelyke reënval tot vogstremming in die suidelike gebiede gelei het, wat gewasse soos mielies en grondbone negatief beïnvloed. Die Noordwes het verbetering getoon ná onlangse reënval, met baie gewasse wat herstel en sommige gebiede wat gemiddeld tot bogemiddelde opbrengste verwag; ongelyke reënval en plaagdruk skep egter steeds plaaslike uitdagings. In geheel het onlangse reënval herstel ondersteun en toestande verbeter, maar variasie in die tydsberekening en verspreiding van reënval beïnvloed steeds die opbrengspotensiaal. Daarom is verdere opvolgreën in die komende weke nodig.

Die 2de NOK-produksieskatting sal op 26 Maart vrygestel word.


Totale Reënval

Totale Reënval/Total Rainfall

Reënval vir die afgelope 30 dae/Rainfall for the past 30 days




**Al die data vir die 2025/26
seisoen is vanaf 1 Julie 2025 tot
18 Maart 2026*



0-50 mm	50-100 mm	100-200 mm	200-300 mm	300-400 mm	400-600 mm	600-800 mm	>800 mm	0-10 mm	10-25 mm	25-50 mm	50-75 mm	75-125 mm	125-175 mm	175-250 mm	>250 mm
---------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------	----------	----------	----------	-----------	------------	------------	---------

Seisoen reënval afwyking/Season rainfall deviation



*Al die data vir die 2025/26 seisoen is vanaf 1 Julie 2025 tot 18 Maart 2026

Reënvalpatrone oor die afgelope paar weke het 'n kritieke rol gespeel in die vorming van gewastoestande oor die somerreënvalstreke, met oor die algemeen positiewe uitkomste waar voldoende vog beskikbaar was, maar steeds variasie in droër gebiede.

Vrystaat:


- ☐ **Noordwes Vrystaat:** Konsekwente en goed verspreide reënval is oor die afgelope paar weke aangeteken, veral in gebiede soos Hoopstad, Bothaville en Wesselsbron. Reënval van ongeveer 40 mm is in dele van die streek aangeteken, wat produksietoestande aansienlik verbeter het.
- ☐ **Oos-Vrystaat:** Goeie reënval is oor die afgelope twee weke in gebiede soos Bethlehem en Fouriesburg aangeteken. Toestande word as nat beskryf, met volgehoue reënval wat bydra tot gunstige produksietoestande.

Limpopo: Reënval was ondergemiddeld en ongelyk versprei oor die afgelope 7-8 weke vanaf die Springbokvlakte tot in die suidelike deel van die provinsie. Hoewel sommige gebiede geïsoleerde reënval tussen 30 mm en 40 mm ontvang het, was dit nie wydverspreid genoeg om algehele toestande beduidend te verbeter nie. Groot variasie bestaan tussen plase, met sommige wat betekenisvolle reën ontvang het, terwyl ander droog bly.

Oostelike-Hoëveld: Goeie reënval is gedurende Maart oor groot dele van die streek aangeteken, veral in gebiede soos Amersfoort, Ermelo en Bergville. Onlangse opvolgreën van ongeveer 12- 15 mm het verdere ondersteuning gebied vir gewasontwikkeling en die aanvulling van grondvog. Hierdie reën was veral voordelig vir later aangeplante gewasse wat vog benodig het tydens kritieke groeistadiums, ná vroeëre droë toestande.

Noordwes: Reënval wat oor die afgelope twee weke ontvang is, het 'n positiewe bydrae gelewer tot gewastoestande in dele van die provinsie, insluitend gebiede soos Lichtenburg, Mareetsane en Sannieshof. Reënvalverspreiding bly egter ongelyk, met sommige gebiede wat voldoende vog ontvang het terwyl ander min tot geen reënval ervaar het.

Grondvog Indeks / Soil Water Index



**Al die data vir die 2025/26 seisoen is vanaf 1 Julie 2025 tot 18 Maart 2026*

Die grondvogindeks vergelyk huidige toestande met beide die vorige seisoen en die 5-jaar gemiddeld.

Vrystaat

- ☐ **Noordwes-Vrystaat:** Grondvogvlakke het aansienlik verbeter ná opeenvolgende reënvalgebeure, met grondprofile wat nou goed aangevul is.
- ☐ **Oos-Vrystaat:** Grondvogvlakke word as baie goed beskryf, met nat toestande oor groot dele van die streek. Die konsekwente reënval het voldoende waterbeskikbaarheid in die grond gehandhaaf, wat veral vroeë aangeplante gewasse bevoordeel.

Limpopo: Grondvogvlakke bly laag oor groot dele van die provinsie weens ondergemiddelde reënval. Sanderige gronde is veral kwesbaar aangesien hulle 'n laer waterhouvermoë het en vinnig vog verloor onder warm toestande. Dit plaas steeds druk op gewasse, veral waar opvolgreën ontbreek.

Oostelike-Hoëveld: Grondvogvlakke is tans goed tot baie goed ná reënval gedurende Maart. Die streek word oor die algemeen as nat beskryf, met voldoende vog beskikbaar om gewasontwikkeling te ondersteun. Vroeëre droë toestande gedurende die seisoen het egter gelei tot laer grondvog vir vroeë aanplantings, wat steeds tekens van stres kan toon.

Noordwes: Grondvogtoestande het verbeter in gebiede wat reën ontvang het, wat bygedra het tot herstel van gewasse ná vroeë droogtestres. Onlangse reënval het gehelp om grondvog aan te vul en waterbeskikbaarheid vir gewasse in reprodktiewe fases te verbeter. Variasie bly egter 'n uitdaging.



Baie Laag
Very Low

Middelmatig Laag
Moderately Low

Effens Laag
Slightly Below


Normaal
Normal

Effens Hoog
Slightly Above

Middelmatig Hoog
Moderate Higher

Baie Hoog
Well Above

Gewasopkoms per Distrik / Crop Greenup per District



*Al die data vir die 2025/26 seisoen is vanaf 1 Julie tot 18 Maart 2026

Die aanwysers vir die opgroening van gewasse beklemtoon die huidige opkoms van gewasse en die ontwikkeling van die kroonblaar relatief tot die 5-jaar gemiddelde.

Vrystaat

- ☐ **Noordwes-Vrystaat:** Die gewasse het aansienlik verbeter na onlangse reënval, met sterk ontwikkeling wat regoor die streek waargeneem is. Verbeterde grondvogtoestande het groei ondersteun.
- ☐ **Oos-Vrystaat:** Goeie ontwikkeling is duidelik regoor die streek, veral in vroeër aangeplante gewasse. Die kombinasie van reënval en voldoende grondvog het gesonde groei bewerkstellig tot op hede.

Limpopo: Gewas ontwikkeling bly beperk en ongelyk as gevolg van langdurige droë toestande en ondergemiddelde reënval. Terwyl sommige lande op geïsoleerde reënvalgebeurtenisse gereageer het, bly die algehele ontwikkeling onder optimale vlakke.

Oostelike Hoëveld: Goeie ontwikkeling is regoor die streek waargeneem na onlangse reënval. Gewasse is in gemengde groeistadiums, met sommige lande wat volwassenheid nader, terwyl ander steeds aktief ontwikkel. Later aanplantings het sterker ontwikkeling getoon as gevolg van verbeterde vogtoestande. Sojabone, tans in R4- tot R5-stadiums in sommige gebiede.

Noordwes: Gewasgroei het verbeter na onlangse reënval, met sigbare herstel in ontwikkeling na vroeëre droogtetoestande. Gewasse vorder goed in die verskillende groeifases. Groei bly egter ongelyk as gevolg van wisselvalligheid in reënvalverspreiding. Later aangeplante gewasse toon oor die algemeen sterker ontwikkeling, terwyl vroeër aangeplante gewasse die impak van vogstres weerspieël. In sommige gebiede kan plaagdruk soos spinmyt die gesondheid van die koppe beïnvloed.

Laag
Low


Middelmatig
Moderate

Hoog
Above

Hoog
High



Gewas Toestand / Crop Condition



*Al die data vir die 2025/26 seisoen is vanaf
1 Julie 2025 tot 18 Maart 2026

Die Groenblaarindeks weerspieël gewasgroei en -ontwikkeling dwarsdeur die seisoen, met toestande in die meeste somerreënvalstreke wat aansienlik bo die 5-jaar gemiddelde is.

Vrystaat

- ☐ **Noordwes-Vrystaat:** Gewastoestande in die streek word as goed beskou. Produsente verwag gemiddeld tot bo gemiddelde opbrengste indien gunstige toestande voortduur.
- ☐ **Oos-Vrystaat:** Produksietoestande bly gunstig, veral vir vroeë aanplantings. Vroeë mielies in gebiede soos Warden is egter deur die Januarie-droogte beïnvloed en kan effens onder die gemiddelde opbrengs lewer. Sojabone het goed herstel na laat reën, asook die sonneblomes en gemiddelde opbrengste word oor 'n groot area verwag.

Limpopo: Gewastoestande is gemeng. In Springbokvlakte is toestande oor die algemeen billik, maar ondergemiddelde reënval beperk steeds prestasie. In droër gebiede soos Nylstroom is gewasse onder hitte- en vogstres. Grondbone toon swak peulvulling, en mieliegroei is swak. Sorghumoes word binnekort verwag. Laat sonneblomme benodig bykomende reënval.

Oostelike Hoëveld: Gewastoestande is gunstig na onlangse reënval. Mielies is in gemengde stadiums, met sommige lande wat oes nader en ander wat steeds ontwikkel met goeie potensiaal. Sojabone presteer goed, met sommige gebiede wat oes nader. Koeler temperature bevorder die droogproses.

Noordwes: Gewastoestande is oor die algemeen gunstig, maar wisselvallig. Mielies het herstel van vroeëre droogtestres en is in die saad, met sommige lande wat nader aan volwassenheid is. Sonneblomme vorder goed, met oes reeds aan die gang in sommige gebiede. Sojabone het potensiaal om goeie opbrengste te lewer. Plaagdruk (spinmyt) is 'n bykomende bron van kommer.

DANKIE!

Vir enige navrae:

Grain SA

Marguerite@grainsa.co.za/ Cathrine@grainsa.co.za/ Gerrit@grainsa.co.za

Vrywaring: Die inligting hierin is verkry uit verskeie bronne, waarvan Graan SA nie die akkuraatheid en/of volledigheid waarborg nie en waarvoor Graan SA geen aanspreeklikheid aanvaar nie. Enige pryse of vlakke hierin vervat is voorlopig en slegs aanduidend en verteenwoordig nie biedings of aanbiedinge nie. Hierdie aanduidings word slegs vir u inligting en oorweging verskaf.

GRAIN | GRAAN