

PRODUKSIETOESTANDE VERSLAG

17 Augustus 2026

Hierdie verslag word elke 2 weke
opgedateer



Gewas toestand
Crop Condition



Klimaat
Climate



Vergelyk
Compare



Opbrengs potensiaal
Production potential



Gewas opkoms
Greenup



Kaarte
Maps



Verslae
Report

Indeks

1. 2025 FINALE OPPERVLAKE AANGEPLANT EN PRODUKSIE-SYFERS
2. 2026 VOORLOPIGE OPPERVLAKTESKATTING
3. DEFINISIES
4. OPSOMMING
5. REËNVAL
6. GEWASOPKOMS
7. GRONDVOG INDEKS
8. GEWAS TOESTAND

FINALE OPPERVLAKE AANGEPLANT EN PRODUKSIE VAN WINTERGRAAN VIR DIE 2025-PRODUKSIESEISOEN

GEWAS	FINALE OPPERVLAKTE HA (A)	FINALE PRODUKSIE AANGEPAS TON (B)	NOK OPPERVLAKTE AANGEPLANT HA (C)	NOK LAASTE SKATTING TON (D)	FINALE OES vs FINALE SKATTING % (B) ÷ (D)
Koring	517 300	1 905 500	517 300	1 897 220	0,44%
Gars	96 950	345 000	96 950	346 430	-0,41%
Kanola	174 515	306 000	174 515	309 035	-0,98%
Hawer	35 520	43 500	35 520	45 143	-3,64%

Op 26 Augustus sal die Hersiene oppervlakte en 1ste produksieskatting, deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel word.

2026 VOORLOPIGE OPPERVLAKTESKATTING

Vrygestel 28 July 2026



CROP/GEWAS	Area planted/ Opp beplant 2026 Ha (A)	Intentions/ Voorname* Mid April 2026 Ha (B)	Area planted/ Opp beplant 2025 Ha (C)	Final crop/ Finale oes 2025 Tons (D)	Change/ Verandering % (A) ÷ (C)
Commercial/Kommersieël:					
Wheat/Koring	473 900	486 400	517 300	1 905 500	-8,4%
Barley/Gars	104 820	101 900	96 950	345 000	8,1%
Canola/Kanola	192 300	189 175	174 515	306 000	10,2%
Oats/Hawer	40 400	39 000	35 520	43 500	13,7%
Sweet lupines/Soetlupine	23 000	21 000	21 000	17 850	9,5%
Total winter/Totaal winter	834 420	837 475	845 285	2 617 850	-1,3%

Definisies

Grondwaterindeks (GWI):

Die GWI is 'n indikasie van die grondwaterpersentasie regdeur die groeiseisoen. Dit vergelyk drie periodes: die huidige seisoen, die vorige seisoen en die 5-jaar gemiddeld. Die 5-jaar gemiddeld dien as 'n basislyn wat tipiese grondwatertoestande aandui.

Groenblaarindeks (GLI)

Die GLI is 'n indikasie van gewasgroei en -ontwikkeling deur die seisoen, met toestande oor die meeste winterreënvalstreke bo die 5 jaar gemiddelde.

Gewastoestande

Gewastoestande beskryf die algehele gesondheid en opbrengspotensiaal van gewasse, gebaseer op reënval, grondvog en omgewingsstresfaktore.

Al die 2026/27 seisoen data is van 20 Maart tot 14 Augustus 2026.

Opsomming

Reënvalpatrone en -tendense

Reënval was oor die algemeen wisselvallig tussen die drie streke. Die Swartland het oorwegend beperkte tot minimale reënval ontvang, terwyl die Suid-Kaap meer gemengde toestande ervaar het met sommige gebiede wat gunstige reënval ontvang het. Die Overberg het die gunstigste reënvaltoestande van die drie streke gehad. Verdere reënval sal veral in die Swartland belangrik wees om die droër toestande te verlig en gewasontwikkeling te ondersteun.


Grondvogdinamika

Grondvogtoestande verskil tussen die streke. Die Swartland bly relatief droog, met onlangse reënval wat slegs gedeeltelike verligting gebied het. In die Suid-Kaap is grondvogtoestande meer gunstig in gebiede wat goeie reënval ontvang het, hoewel toestande steeds wisselvallig is. Die Overberg se grondvogtoestande is tans die gunstigste, met voldoende vog om gewasontwikkeling te ondersteun. Voortgesette reënval sal egter belangrik wees namate gewasse die reprodktiewe en graanvulstadiums betree.

Gewasopkoms en -toestand

Gewasontwikkeling is oor die algemeen bevredigend, hoewel die droë toestande in die Swartland toenemend druk op gewasse plaas. Vroeë aangeplante kanola in die Swartland en Suid-Kaap beweeg na die einde van blom, terwyl later aangeplante kanola steeds aktief blom. Koring en gars beweeg geleidelik na die aarvorming en graanvulstadiums. Die Overberg toon tans die gunstigste gewastoestande, terwyl die Swartland die meeste behoefte aan verdere reënval toon om die oorblywende opbrengspotensiaal te ondersteun.

Totale Reënval/Total Rainfall



Suid-Kaap

Reënval oor die Suid-Kaap was wisselvallig, met sommige produksiegebiede wat gunstiger reënval ontvang het, terwyl ander slegs minimale reënval gekry het. Onlangse reënbuie het in verskeie gebiede waardevolle vog voorsien en gewasontwikkeling ondersteun. Verdere reënval sal voordelig wees om gunstige toestande te handhaaf namate gewasse deur hul reprodutiewe stadiums vorder.

Swartland



Reënval oor die Swartland was wisselvallig en het tussen produksiegebiede verskil. Sommige gebiede het gedurende die afgelope week minimale reënval ontvang, terwyl ander gebiede gunstiger reënval gekry het. Die reënval was egter nie voldoende om die droë toestande ten volle te verlig nie en verdere reënval sal voordelig wees vir gewasontwikkeling gedurende die res van die seisoen.

Overberg

Die Overberg het gedurende die afgelope week oor die algemeen gunstige reënval ontvang, hoewel toestande tussen produksiegebiede gewissel het. Die onlangse reënval het waardevolle vog voorsien en gewasontwikkeling regoor die streek ondersteun. Oor die algemeen was die reënvaltoestande gunstiger as in sommige van die omliggende produksiegebiede.

Reënval vir die afgelope 30 dae/Rainfall for the past 30 days


Seisoen reënval afwyking/Season rainfall deviation



0-10 mm 10-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-125 mm 125-175 mm 175-250 mm >250 mm

Baie Laag Very Low Middelmatig laag Moderately Low Effens Laag Slightly Below Normaal Normal Effens Hoog Slightly Above Middelmatig Hoog Moderate Higher Baie Hoog Well Above

Grondvog Indeks / Soil Water Index



Suid-Kaap

Grondvogtoestande is oor die algemeen gunstig in gebiede wat onlangs reënval ontvang het, hoewel toestande steeds tussen produksiegebiede wissel. Die onlangse reënval het gehelp om grondvogvlakke aan te vul en vogstremming in verskeie gebiede te verminder. Voortgesette reënval sal belangrik bly om voldoende vogvlakke gedurende die res van die groeiseisoen te handhaaf.


Swartland

Grondvogtoestande bly relatief laag regoor die streek. Hoewel onlangse reënval in sommige gebiede plaaslike verligting gebied het, is grondvog nog nie ten volle aangevul nie. Die huidige toestande word al hoe meer sigbaar in gebiede waar gewasse die reprodutiewe stadiums betree en verdere reënval sal graanvulling ondersteun en help om opbrengspotensiaal te handhaaf.

Overberg

Grondvogtoestande is tans in die meeste gebiede gunstig ná die onlangse reënval. Die verbeterde vogbeskikbaarheid het gewasontwikkeling ondersteun, en geen beduidende vogverwante probleme is in gebiede met gunstige reënval aangemeld nie. Voortgesette reënval sal belangrik wees namate gewasse die graanvullingsfase betree.

Gewasopkoms per Distrik / Crop Greenup per District



Suid-Kaap

Gewasgroei en -ontwikkeling vorder oor die algemeen goed ná die onlangse reënval. Vroeë aangeplante kanola beweeg na die einde van die blomstadium, terwyl later aangeplante kanola steeds aktief blom. Verskille in gewasontwikkeling is sigbaar afhangende van die plantdatum en plaaslike reënvaltoestande.


Swartland

Gewasgroei en -ontwikkeling is beperk deur die langdurige droë toestande. Vroeë aangeplante gewasse toon oor die algemeen groter veerkragtigheid, terwyl later aangeplante gewasse meer onder druk verkeer namate die seisoen vorder. Gewasontwikkeling bly afhanklik van die beskikbaarheid van verdere reënval.

Overberg

Gewasgroei en -ontwikkeling vorder goed regoor die streek. Onlangse reënval het voortgesette gewasontwikkeling ondersteun, met gewasse wat oor die algemeen goeie groeikragtigheid behou. Vroeë aangeplante kanola beweeg na die einde van die blomstadium, terwyl koring en gars die reprodutiewe en graanvullingsfases betree.

Gewas Toestand / Crop Condition



Suid-Kaap

Gewastoestande regoor die streek is oor die algemeen gunstig, hoewel daar 'n mate van variasie tussen produksiegebiede voorkom. Vroeë aangeplante kanola begin sy kleur verloor namate dit verder as die blomstadium vorder, terwyl later aangeplante kanola steeds groen is en aktief blom. Koring en gars ontwikkel steeds, met sommige gebiede wat nog besig is om na aarontwikkeling te vorder. Swambeheer bly 'n belangrike oorweging by gars, veral waar ouer kultivars met swakker siekteweerstand aangeplant is. Oor die algemeen het onlangse reënval gewastoestande ondersteun, terwyl verdere reënval voordelig sal wees vir voortgesette ontwikkeling.

Swartland

Gewastoestande wissel oor die Swartland, met sommige gebiede wat beter presteer as ander. Vroeë aangeplante kanola is naby die einde van die blomstadium en begin sy kleur verloor. Vroeë aangeplante koring vorder deur die aarontwikkelingsfase en hou oor die algemeen goed stand, hoewel verdere vog voordelig sal wees namate die gewas graanvulling nader. Later aangeplante koring ervaar meer druk weens die kombinasie van droë toestande en die gevorderde stadium van die seisoen. Gars vorder ook deur die aarontwikkelingsfase, hoewel toestande steeds wisselvallig is. Swambeheer verg steeds aandag in sommige garlande weens die kultivars wat aangeplant is en hul relatief swakker siekteweerstand. Oor die algemeen sal die streek baat vind by verdere reënval om die oorblywende gewasontwikkeling te ondersteun.

Overberg

Gewastoestande in die Overberg is oor die algemeen goed. Vroeë aangeplante kanola nader die einde van die blomstadium, terwyl koring en gars begin vorder na die graanvullingsfase. Die onlangse reënval het gunstige toestande gedurende hierdie belangrike ontwikkelingsfases voorsien. Oor die algemeen toon die streek tans positiewe gewastoestande, hoewel voortgesette reënval belangrik sal bly om graanvulling te ondersteun en opbrengspotensiaal te handhaaf.

DANKIE!

Vir enige navrae:

Graan SA

Cathrine@grainsa.co.za/Gerrit@grainsa.co.za/ Marguerite@grainsa.co.za

Vrywaring: Die inligting hierin is verkry uit verskeie bronne, waarvan Graan SA nie die akkuraatheid en/of volledigheid waarborg nie en waarvoor Graan SA geen aanspreeklikheid aanvaar nie. Enige pryse of vlakke hierin vervat is voorlopig en slegs aanduidend en verteenwoordig nie biedings of aanbiedinge nie. Hierdie aanduidings word slegs vir u inligting en oorweging verskaf.

GRAIN | GRAAN